

ÉCHELLE AMIEL-TISON

Élaborée pour mesurer la douleur postopératoire nourrisson de 1 à 7 mois

Utilisable de 0 à 3 ans

Score de 0 à 20, inversé par rapport à l'original

	JOUR	HEURE																		
SOMMEIL PENDANT L'HEURE PRÉCÉDENTE																				
0 : Sommeil calme de plus de 10 minutes																				
1 : Courtes périodes de 5 à 10 minutes																				
2 : Aucun																				
MIMIQUE DOULOUREUSE																				
0 : Visage calme et détendu																				
1 : Peu marquée, intermittente																				
2 : Marquée																				
QUALITÉ DES PLEURS																				
0 : Pas de pleurs																				
1 : Modulés, calmés par des incitations banales																				
2 : Répétitifs, aigus, douloureux																				
ACTIVITÉ MOTRICE SPONTANÉE																				
0 : Activité motrice normale																				
1 : Agitation modérée																				
2 : Agitation incessante																				
EXCITABILITÉ ET RÉPONSE AUX STIMULATIONS AMBIANTES																				
0 : Calme																				
1 : Réactivité excessive à n'importe quelle stimulation																				
2 : Trémulations, clonies, Moro spontané																				
FLEXION DES DOIGTS ET DES ORTEILS																				
0 : Mains ouvertes, orteils non crispés																				
1 : Moyennement marquée, intermittente																				
2 : Très prononcée et permanente																				
SUCCION																				
0 : Forte, rythmée, pacifiante																				
1 : Discontinue (3 ou 4), interrompue par les pleurs																				
2 : Absente, ou quelques mouvements																				
ÉVALUATION GLOBALE DU TONUS MUSCULAIRE																				
0 : Normal pour l'âge																				
1 : Modérément hypertonique																				
2 : Très hypertonique																				
CONSO LABILITÉ																				
0 : Calmé en moins d'une minute																				
1 : Calmé après 1 à 2 minutes d'effort																				
2 : Aucune après 2 minutes d'effort																				
SOCIABILITÉ, contact visuel, réponse à la voix, intérêt pour un visage en face																				
0 : Facile, prolongée																				
1 : Difficile à obtenir																				
2 : Absente																				
SCORE TOTAL DE 0 (PAS DE DOULEUR) A 20 (DOULEUR MAJEURE)																				

Barrier G, Attia J, Mayer MNB, Amiel-Tison C, Schnider SM. Measurement of post-operative pain and narcotic administration in infants using a new clinical scoring system. Intensive Care Med 1989 ; 15 : 37-9