

QUESTIONNAIRE SUR L'UTILISATION DE LA CRÈME EMLA®

POUR LES PONCTIONS VEINEUSES ET ARTERIELLES

Bonnes réponses surlignées

- Vous êtes - médecin - interne - infirmière - cadre
Vous travaillez - de jour - d'après-midi - de nuit

1°) Vous utilisez la crème EMLA® (pensez à votre dernier jour de travail)

| pour les ponctions veineuses | pour les ponctions artérielles |
|--|--|
| a- systématiquement, pour toutes les ponctions | a- systématiquement, pour toutes les ponctions |
| b- pour environ 3 ponctions sur 4 | b- pour environ 3 ponctions sur 4 |
| c- pour environ 2 ponctions sur 4 | c- pour environ 2 ponctions sur 4 |
| d- pour environ une ponction sur 4 ou moins | d- pour environ une ponction sur 4 ou moins |

2°) Quelle est la durée minimum d'application avant la ponction qui permet une anesthésie satisfaisante ?

| pour les ponctions veineuses | pour les ponctions artérielles |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| a- deux heures | a- deux heures |
| b- une heure trente | b- une heure trente |
| c- une heure | c- une heure |
| d- une demi-heure | d- une demi-heure |

3°) Quelle est la dose de crème à appliquer sur un site ? (1 mL = 1 gramme)

| 0-3 mois | 3 mois-12 mois | 12 mois-6 ans | après 6 ans |
|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| a- 0,5 grammes | a- 0,5 grammes | a- 1 gramme | a- 1 à 2 grammes |
| b- 1 gramme | b- 1 gramme | b- 2 grammes | b- 5 grammes |
| c- 2 grammes | c- 2 grammes | c- 5 grammes | c- 10 grammes |
| d- 5 grammes | d- 5 grammes | d- 10 grammes | d- 20 grammes |

4°) A votre avis, quelle est la dose maximum de crème à appliquer en 24 heures ? (1 mL = 1 gramme)

| 0-3 mois | 3 mois-12 mois | 12 mois-6 ans | après 6 ans |
|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| a- 0,5 grammes | a- 0,5 grammes | a- 1 gramme | a- 1 à 2 grammes |
| b- 1 gramme | b- 1 gramme | b- 2 grammes | b- 5 grammes |
| c- 2 grammes | c- 2 grammes | c- 5 grammes | c- 10 grammes |
| d- 5 grammes | d- 5 grammes | d- 10 grammes | d- 20 grammes |

5°) Quelles sont les contre-indications à l'emploi de l'EMLA® ?

Nouveau-né prématuré < 37 semaines (emploi hors AMM possible sur protocole dans un service)

Application sur muqueuse (emploi hors AMM possible sur protocole dans un service)

Allergie aux anesthésiques locaux, porphyrie, méthémoglobinémie

6°) Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'utilisation de l'EMLA® ?

Blanchiment de la peau

Délai d'attente à prévoir, à gérer, problème d'organisation entre les équipes

Pansement qui coule, se décolle, fait mal au retrait