

Anote todo lo que observe... Aunque piense que los signos observados no son debidos al dolor sino al miedo, a la incomodidad, a la fatiga o a la gravedad de la enfermedad.

Identificación	Signo ausente	Signo leve o pasajero	Signo moderado o aproximadamente la mitad del tiempo	Signo severo o todo el tiempo	Primera evaluación		Evaluación Después del tratamiento ³					
					Antálgico		R		R		R	
					En « reposo » en calma ¹ (R)	Durante el examen ² o a la movilización (M)	M	M	M	M		
Expresión vocal o verbal												
Llora y/o grita y/o gime y/o dice que le duele	0	1	2	3								
Mímica												
Frente fruncida y/o cejas arrugadas y/o boca crispada	0	1	2	3								
Movimientos												
Se agita y/o cuerpo rígido y/o crispación	0	1	2	3								
Posiciones												
Presenta una posición inhabitual y/o antálgica y/o protege una parte del cuerpo y/o se queda inmóvil	0	1	2	3								
Relación con su entorno												
Puede ser consolado y/o se interesa los juegos y/o comunica con su entorno	normal 0	disminuido 1	muy disminuido 2	ausente 3								
Comentarios	Total /15											
	Fecha y hora											
	Iniciales del evaluador											

¹ Observar el niño antes de cualquier examen, en condiciones confortables y en situación de confianza. Por ejemplo, de lejos, cuando el niño está en la sala de espera con los padres...

² Se trata de la observación durante el examen físico o a la movilización o palpación de la zona dolorosa por la enfermera o el médico.

³ Valorar nuevamente, después de la administración del tratamiento antálgico, al momento del pico de acción : después de 30 a 45 min si via oral o rectal y después de 5 a 10 minutos si via venosa.