

Noteer al uw vaststellingen, zelfs indien u denkt dat de uitingen niet veroorzaakt zijn door pijn maar door angst, ongemak, vermoeidheid of de ernst van de ziekte

Naam	Uiting afwezig	Uiting zwak of tijdelijk	Uiting matig of de helft van de tijd	Uiting uitgesproken of bijna permanent	Evaluatie bij aankomst		Volgende evaluaties Evaluaties na pijnstillers ³							
					In rust ¹ (R)	Tijdens een onderzoek of het bewegen ² (M)	Analgeticum		R		M			
							R	M	R	M	R	M		
Vocale of verbale uitdrukking														
huilt en/of schreeuwt en/of kreunt en/of zegt dat hij pijn heeft	0	1	2	3										
Gelaatsuitdrukking														
gefronst voorhoofd en/of gefronste wenkbrauwen en/of door pijn getrokken mond	0	1	2	3										
Bewegingen														
is onrustig en/of verstijft en/of krampachtig	0	1	2	3										
Houding														
ongewone en/of pijnontwijkende houding en/of beschermd zich en/of blijft onbeweeglijk	0	1	2	3										
contact met zijn omgeving														
is troostbaar en/of interesseert zich voor spel en/of houdt contact met de omgeving	normaal 0	verminderd 1	sterk verminderd 2	afwezig 3										
Opmerkingen	Totale score /15													
	Datum en uur													
	Initialen van de beoordeler													

¹ In rust, in kalme (R) : observatie van het kind vóór verzorging of onderzoek, in de best mogelijke omstandigheden van vertrouwen en comfort, bijvoorbeeld van op afstand, in het bijzijn van zijn ouders, als hij speelt.

² Tijdens een onderzoek of het bewegen (M) : het gaat om het klinisch onderzoek of de mobilisatie van de pijnlijke plaats door de verpleegkundige of de arts.

³ Regelmatig herevalueren, en dit vooral na het toedienen van pijnstillers waarvoor de piekwerking is : 30 tot 45 minuten na orale of rectale toediening, 5 tot 10 minuten na intraveneuze toediening. Duidt aan of het in rust (R) of in beweging (M) is.