

## Tableau de prise en charge de la douleur provoquée par les soins

soins	Première intention	Deuxième intention
Ponctions veineuses et pose de cathéters courts veineux	EMLA systématique pour les enfants de moins de 11 ans et pour les grands qui le souhaitent Succion sucrée antalgique chez le nourrisson de moins de 6 semaines	MEOPA pour les enfants difficiles à piquer ou ceux ayant la phobie du geste
Vaccins, injections sous cutanées	EMLA sauf BCG Succion sucrée antalgique chez le nourrisson de moins de 6 semaines	
Ponctions lombaires	EMLA + MEOPA EMLA + Succion sucrée antalgique chez le nourrisson de moins de 6 semaines	
sutures	MEOPA +/- anesthésie locale	Sédation, voire anesthésie générale
Pansements et pansements de brûlures	MEOPA + antalgiques selon EVA	Sédation, voire anesthésie générale
Réduction de paraphimosis	MEOPA + gel de xylocaïne	
Réduction de certaines luxations et fractures peu déplacées	MEOPA + morphine Cf protocole Dr L.Sarhou	Sédation, voire anesthésie générale
Pose de sondes	MEOPA + gel de xylocaïne Succion sucrée antalgique chez le nourrisson de moins de 6 semaines	