

Parmi ces signes, quels sont ceux qui évoquent la douleur aiguë et ceux d'un enfant qui a peur ?

Peur	Douleur aiguë		Peur	Douleur aiguë	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Visage contracté		<input checked="" type="checkbox"/>	Postures antalgiques
	<input checked="" type="checkbox"/>	Grimace			Refus de parler et de communiquer
		Gémissements		<input checked="" type="checkbox"/>	Raideur
		Fourmillements		<input checked="" type="checkbox"/>	Protection de la zone douloureuse
		Lenteur des mouvements			Enfant inexpressif
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pleurs		<input checked="" type="checkbox"/>	Désaturation en oxygène
		Désintérêt		<input checked="" type="checkbox"/>	Hypertension artérielle
		Ne bouge pas			Sensation de brûlure
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cris	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Refus de jouer
		Douleur à l'effleurement (allodynie)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Agitation
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tachycardie			Sensation de décharge électrique

Beaucoup de signes sont communs à la douleur aiguë et à la peur.

Si la situation est source de douleur, administrer un antalgique et prendre en charge parallèlement le contexte anxiogène.