

Parmi ces signes, quels sont ceux qui évoquent la douleur prolongée et ceux d'un enfant dépressif ?

Douleur prolongée	Dépression		Douleur prolongée	Dépression	
<input checked="" type="checkbox"/>		Visage contracté	<input checked="" type="checkbox"/>		Postures antalgiques
		Grimace	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Refus de parler et de communiquer
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gémissements	<input checked="" type="checkbox"/>		Raideur
		Fourmillements	<input checked="" type="checkbox"/>		Protection de la zone douloureuse
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Lenteur des mouvements	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Enfant inexpressif
		Pleurs			Désaturation en oxygène
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Désintérêt			Hypertension artérielle
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ne bouge pas			Sensation de brûlure
		Cris	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Refus de jouer
		Douleur à l'effleurement (allodynie)			Agitation
		Tachycardie			Sensation de décharge électrique

La présence ou l'absence d'un seul signe a peu de valeur (l'absence de pleurs ne signifie pas que l'enfant n'a pas mal !).
 Beaucoup de signes sont communs à la douleur prolongée et à la dépression.
 Seules les postures antalgiques, les contractures, la raideur et la protection de la zone douloureuse permettent de les distinguer.