

Notez tout ce que vous observez.
Évaluez toujours : au repos et à la mobilisation,
avant et après l'antalgique.

	Signe absent	Signe faible ou passager	Signe moyen ou environ la moitié du temps	Signe fort ou quasi permanent
Expression vocale ou verbale				
pleure <i>et/ou</i> crie <i>et/ou</i> gémit <i>et/ou</i> dit qu'il a mal	0	1	2	3
Mimique				
a le front plissé <i>et/ou</i> les sourcils froncés <i>et/ou</i> la bouche crispée	0	1	2	3
Mouvements				
s'agite <i>et/ou</i> se raidit <i>et/ou</i> se crispe	0	1	2	3
Positions				
a une attitude inhabituelle <i>et/ou</i> antalgique <i>et/ou</i> se protège <i>et/ou</i> reste immobile	0	1	2	3
Relation avec l'environnement				
peut être consolé <i>et/ou</i> s'intéresse aux jeux <i>et/ou</i> communique avec l'entourage	normale 0	diminuée 1	très diminuée 2	absente 3
Seuil de traitement 4/15	Score total /15			

Score 1-3 : douleur faible Score 4-7 : douleur modérée Score 8-15 : douleur intense à très intense

Pour le choix de l'antalgique, tenir compte de l'intensité la plus élevée, en général à la mobilisation, et de la cause de la douleur.

Evaluation
Enfant
Douleur

EVENDOL



Echelle validée
de la naissance à 7 ans.

EVENDOL mesure la douleur des enfants de 0 à 7 ans.

Notez tout ce que vous observez... même si vous pensez que les signes ne sont pas dus à la douleur, mais à la peur, à l'inconfort, à la fatigue ou à la gravité de la maladie.

Au repos au calme (R) : observez l'enfant avant tout soin ou examen, dans les meilleures conditions possibles de confort et de confiance, par exemple à distance, avec ses parents, quand il joue...

A l'examen ou la mobilisation (M) : il s'agit de l'examen clinique ou de la mobilisation ou palpation de la zone douloureuse par l'infirmière ou le médecin.

Réévaluez régulièrement en particulier après antalgique, au moment du pic d'action : après 30 à 45 minutes si oral ou rectal, 5 à 20 minutes si IV. Précisez la situation, au repos (R) ou à la mobilisation (M).

© 2011 - Groupe EVENDOL - Contact : pediadol@yahoo.fr

Zid et Zen communication 01 46 49 96 79

EVENDOL est élaborée et validée :

- pour tous les contextes : de la douleur aiguë (cris, protestation) à la douleur installée, prolongée (immobilité, prostration, jusqu'à l'atonie psycho-motrice)
- pour les urgences : des simples consultations, suivies ou non d'hospitalisation, jusqu'à l'intervention SAMU
- en post-opératoire
- dès la naissance (à la maternité ou en néonatalogie) et jusqu'à l'âge où l'enfant peut s'évaluer.

Pédiadol
LA DOULEUR DE L'ENFANT

Plus d'infos sur
www.pediadol.org



Pour commander :
www.spadrap.org